


野菜、花卉、果樹、特用作物に!!

コンリキ

有機酸(25%液)



- ★ 有機酸の作用により根量が多くなり、活力ある新根の発生が期待できます。
- ★ 生育期間中の活力増強に役立ちます。
- ★ 土壌成分を有効化します。

〈使用上の注意〉

- 強酸性ですので、直接葉にかからないよう注意してください。
- 強酸性ですので、眼に入ったり皮膚にかかたりしないよう注意してください。
- アルカリ性剤とは、混用しないでください。
- 水耕、ロックウール栽培には、使用しないでください。

梱包 20kg

■ 発売元

■ 製造元



玉名化学株式会社

〒869-0312 熊本県玉名郡玉東町大字白木987番地の1
TEL0968-85-3161 FAX0968-85-2864

使用作物一使用例

灌水
灌注用

作物名	施用方法
イチゴ	育苗期 7日～10日毎に1000倍灌水
	生育期 3kg(10a当り)、又は500倍 月2～3回程度灌水
アスパラ	収穫期間中 3kg(10a当り)、又は500倍 月2～3回程度灌水
トマト	定植後 5kg(10a当り)、又は300～500倍 月2～3回程度灌水
ナス ピーマン シシトウ	定植後 5kg(10a当り) 又は300～500倍 月2～3回程度灌水
キュウリ	定植後 5kg(10a当り)、又は300～500倍 月2～3回程度灌水
メロン スイカ	定植後 3kg(10a当り)、又は500倍 月2～3回程度灌水
花卉類	定植後 3kg(10a当り)、又は500倍 月2～3回程度灌水
果樹類	発根期前より 10kg(10a当り)、又は300～500倍 2～3回程度灌水
その他 ニラ、ゴーヤ等	定植後 5kg(10a当り) 又は300～500倍 月2～3回程度灌水

上記《使用作物一使用例》は、あくまでも一般的な使用例です。

本製品は強酸性ですので、イチゴ、アスパラ、花卉類等、酸性に弱い作物は、液を薄めに散布してください。

また、作物の状態、使用時期等を考慮して液の濃淡を調節し、上手に施用してください。