

**発根促進・作物活性剤**

# 糖コンリキ30 (トーコン)

**糖 蜜 30%**  
**有機酸 25%**  
**梱包 20kg**

**使用方法：土壌灌水（使用作物＝使用例は裏面をご覧ください。）**

**★根量が多くなり、活力ある新根の発生が期待できます。**

**★土壌中の微生物の繁殖が旺盛になります。**

**★生育期間中の活力増強に役立ちます。**

（使用上の注意）

- 本製品は強酸性ですので、直接葉に散布しないよう注意してください。
- 本製品は強酸性ですので、眼に入ったり皮膚に付着したりしないよう注意してください。  
万一の場合、流水で速やかに洗い流してください。
- アルカリ性剤とは、混用しないでください。
- 有機質による沈殿が出来る場合がありますが、肥効等には何ら影響ございません。

■発売元

■製造元



**玉名化学株式会社**

〒869-0312 熊本県玉名郡玉東町白木987-1

TEL 0968-85-3161

FAX 0968-85-2864

# 使用作物一使用例

灌水  
灌注用

作物名	施用方法
イチゴ	育苗期 7日～10日毎に1000倍灌水
	生育期 3kg(10a当り)、又は500倍 月2～3回程度灌水
アスパラ	収穫期間中 3kg(10a当り)、又は500倍 月2～3回程度灌水
トマト	定植後 5kg(10a当り)、又は300～500倍 月2～3回程度灌水
ナス ピーマン シシトウ	定植後 5kg(10a当り) 又は300～500倍 月2～3回程度灌水
キュウリ	定植後 5kg(10a当り)、又は300～500倍 月2～3回程度灌水
メロン スイカ	定植後 3kg(10a当り)、又は500倍 月2～3回程度灌水
花卉類	定植後 3kg(10a当り)、又は500倍 月2～3回程度灌水
果樹類	発根期前より 10kg(10a当り)、又は300～500倍 2～3回程度灌水
その他 こら、ゴーヤ、お茶等	定植後 5kg(10a当り) 又は300～500倍 月2～3回程度灌水

上記《使用作物一使用例》は、あくまでも一般的な使用例です。

本製品は強酸性ですので、イチゴ、アスパラ、花卉類等、酸性に弱い作物は、液を薄めに散布してください。

また、作物の状態、使用時期等を考慮して液の濃淡を調節し、上手に施用してください。